

*Cistothorus apolinari*

# CUCARACHERO DE APOLINAR

## CARACTERÍSTICAS

Pertenece a la familia **Troglodytidae**, es un ave pequeña, son muy activos y con cantos muy variados. Estos cucaracheros **pueden medir hasta 13cms**, son rechonchos y de pico delgado, a menudo con colas cortas y erectas. Los patrones de color son **pardos, moteados y rayados**, con frecuencia de gris o blanco debajo, les permite confundirse fácilmente con el medio, llamándose a estos **plumajes crípticos** (1). Es un ave **muy difícil de observar**, pero se le puede localizar por su canto más frecuente en las mañanas.



© 2013 Wikipedia, Neil Díaz, Creative Commons CC BY-SA 2.0



© 2017, Diana Carolina Macana, Foto en Páramo de Siscunsi

## DIETA

Esta especie se alimenta de **insectos acuáticos** que encuentra en la vegetación como quironómidos, arañas, braconidos, cilicidos, zygópteros y larvas de lepidópteros (4).

## ZONAS DE DISTRIBUCIÓN

El Cucarachero de Apolinar es una especie **endémica** que habita **elevaciones de 2500 — 4000m** en la porción norte de la Cordillera Oriental de Colombia, en los departamentos de **Boyacá** (Sierra Nevada del Cocuy, páramo de Siscunsi, Lago de Tota) y **Cundinamarca** (el valle de Ubaté, la Sabana de Bogotá, el páramo de Sumapaz) (1).


Conoce más del Cucarachero de Apolinar en: [a1.abctota.org](http://a1.abctota.org) | Y conoce sobre las aves del Lago de Tota en: [aves.abctota.org](http://aves.abctota.org) | Iniciativa de la Fundación Montecito.

## COMPORTAMIENTO SOCIAL

El Cucarachero de Apolinar vive en **grupos de 2 a 12** individuos, con una pareja reproductiva y varios juveniles, los cuales ayudan en la alimentación de pichones y la defensa del territorio (2). Tiene un **canto enérgico**, es muy rítmico y áspero, recuerda mucho **el sonido de una matraca**. Es un dúo entre macho y hembra, pero a veces todo un grupo familiar canta (1, 3).

## HÁBITAT Y ANIDACIÓN

Vive en **humedales y zonas pantanosas**, entre los juncos, enneas, chuscales, del altiplano cundiboyacense. Anida en **juncales muy densos** y en zonas inundadas para protegerse de depredadores. Sus nidos se han encontrado entre **1-2 metros del suelo**, y tienen la entrada lateral (2). Las temporadas de anidación son en **marzo y agosto** (4).



## AMENAZAS

**El Cucarachero de Apolinar es endémico de Colombia y está amenazado de extinción. Además como es un ave sedentaria, no puede adaptarse a otros hábitats — si el suyo se destruye, no sobrevive.**

- La pérdida del hábitat o fragmentación de los juncales por corte o quema para cultivos y praderización.
- La contaminación de los humedales y la disminución de los cuerpos de agua, que genera una pérdida de especies acuáticas y de macroinvertebrados de los cuales se alimenta esta especie.
- Parasitación de los nidos por parte de otra ave, el *Molothrus bonariensis*.
- Presencia de mascotas en los juncales, gatos principalmente.
- Mucha actividad humana cercana, ruido y uso de lanchas rápidas que producen oleaje fuerte.

\*De acuerdo con el Libro Rojo de Aves de Colombia 2016

Fuentes: 1. Hilty y Brown 1986; 2. Stiles y Caycedo 2002; Morales-Rozo y De La Zerda 2004 en Libro Rojo de Aves de Colombia 2016; 3. ABO, 2000; 4. Palacio 2013, Wiki Aves de Colombia. Imágenes: 1. Wikipedia; 2. Diana Carolina Macana; 3. ESRI, IUCN Red List.